

영릉향
(零陵香)

Lysimachiae Foenum-Graeci Herba

영향초(靈香草)

이 약은 영향풀(靈香草) *Lysimachia foenum-graeci* Hance (앵초과 Primulaceae)의 전초이다.

성 상 이 약은 전초로 줄기는 원기둥모양이고 길이 40 ~ 60 cm이며, 세로무늬가 있고 3 ~ 5줄의 뽕족한 날개모양의 조직이 능선에 붙어 있다. 잎은 넓은 계란모양이고 어긋나 있으며, 지름 4 ~ 6 cm이고 잎끝은 뽕족하며 잎의 아래쪽 양측은 잎자루를 따라 아래로 연장되어 날개 모양이고, 바깥면은 녹색이다. 구형의 삭과는 잎겨드랑이에서 나는데 열매자루는 비교적 가늘고 연약하며 길이 2 ~ 3 cm 정도이다.

이 약은 강한 향기가 있으며 맛은 약간 달고 쓰다.

확인시험 1) 이 약의 가루 0.5 g에 에탄올 10 mL를 넣어 끓여서 여과한 여액에 염화철(III)시액을 떨어뜨리면 녹색 ~ 파란색을 나타낸다.

순도시험 1) 이물 이 약은 이물이 3 % 이상 섞여서는 안된다.

2) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

3) 잔류농약 가) 총 디디티(총 DDT : p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합계) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린(Dieldrin) 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치씨(총 BHC : α,β,γ 및 δ-BHC의 합계) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린(Aldrin) 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린(Endrin) 0.01 ppm 이하.

건조감량 15.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.